

# [CISTOS EPIDERMÓIDES]

## Cistos epidermóides

- **Anamnese**: Canino, SRD, fêmea/castrada, preta, 1999;
- **Histórico**: Proprietário notou o aparecimento de nódulo cutâneo no animal. Não sabe dizer quanto tempo o animal possui as lesões pois só as notou no presente momento. Não relata dor ou prurido. Normofagia, normúria normoquesia e normodipsia;
- **Exame dermatológico**: Presença de nódulos cutâneos macios, não aderidos, indolores, localizados na região cefálica, região escapular esquerda e na cauda;



- **Suspeitas clínicas**: Lipoma? Mastocitoma?
- **Tratamento**:
  - Foi realizada exérese cirúrgica dos nódulos e solicitada avaliação histopatológica;

- **Histopatologia:**

- **MACROSCOPIA:** Fragmento com nódulo cístico, medindo aproximadamente 3,0 cm de diâmetro, consistência firme e coloração acinzentada, núcleo com massa acinzentada.

**MICROSCOPIA:** O exame microscópico revelou fragmento de pele apresentando estruturas císticas localizadas na derme, circunscritas e bem demarcadas. Estas estruturas são preenchidas por ceratina lamelar e delimitadas por parede composta por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado.

**CONCLUSÃO: CISTOS EPIDERMÓIDES**

**OBS:** Os cistos epidermóides são estruturas saculares, não neoplásicas, com origem em folículo piloso e que apresentam um comportamento benigno. Contudo, a ruptura de tais estruturas pode levar a um processo inflamatório granulomatoso local. A cirurgia é curativa.