

[DERMATITE ALÉRGICA A PICADA DE PULGAS - DAPP]

Animal iniciou quadro pruriginoso acentuado há 7 dias. Proprietário relata que as lesões iniciaram após a ida do cão ao banho no Pet shop. Não tem acesso à rua e nem possui contactantes. Fica a maior parte do tempo em quintal, mas tem acesso a casa. Medicou o animal com antibióticos por conta própria e não observou nenhuma melhora. Normofagia (Ração comercial), normúria, normoquesia e normodipsia. Ativo. Vacinação e vermifugação em dia. Toma banho semanalmente com xampu canino neutro. Não faz controle mensal de ectoparasitas.

Dermatite Alérgica a Picada de Pulgas - DAPP

- **Anamnese:** Canino, macho, SRD, tricolor, 3 anos, não castrado;
- **Histórico:** Animal iniciou quadro pruriginoso acentuado há 7 dias. Proprietário relata que as lesões iniciaram após a ida do cão ao banho no Pet shop. Não tem acesso à rua e nem possui contactantes. Fica a maior parte do tempo em quintal, mas tem acesso a casa. Medicou o animal com antibióticos por conta própria e não observou nenhuma melhora. Normofagia (Ração comercial), normúria, normoquesia e normodipsia. Ativo. Vacinação e vermifugação em dia. Toma banho semanalmente com xampu canino neutro. Não faz controle mensal de ectoparasitas.
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratado, ouvidos normais, linfonodos sem alteração, ausculta cardiopulmonar sem alteração, palpação abdominal sem alteração, t°C 39, presença de pulgas/fezes (infestação moderada), peso: 20kg
- **Exame dermatológico:** Presença de hipotricose acentuada e lesões papulares e crostosas na região dorsal, mais precisamente na região lombossacra. Leve infecção bacteriana secundária. Alopecia não inflamatória na região periocular. Prurido acentuado;
- **Exames complementares:**
 1. Exame Parasitológico do Raspado Cutâneo: Negativo
 2. Triagem com lâmpada de Wood: Negativo
 3. Micológico direto: Negativo

Dermatite Alérgica a Picada de Pulgas - DAPP

- **Suspeita clínica:** Dermatite Alérgica a Picada de Pulgas
- **Tratamento:**

Medicação tópica a base de Fipronil, Nintempiram VO, Prednisona VO e Clorexidine tópico 2 vezes/semana.

Obs.: O animal retornou 7 dias após o início do tratamento com ausência de ectoparasitas e prurido, resolução total das lesões inflamatórias e reepilação parcial.

Remissão total do quadro em 30 dias



ANTES DO TRATAMENTO



ANTES DO TRATAMENTO



7 DIAS APÓS O INÍCIO DO TRATAMENTO



ANTES DO TRATAMENTO



7 DIAS APÓS O INÍCIO DO TRATAMENTO