

[DERMATITE ATÓPICA FELINA]

- **Anamnese:** Felino, SRD, fêmea, castrada, 2007;

Histórico: O animal foi adquirido da rua em 2007. Convive com um gato macho/ castrado, SRD. Ambos ficam dentro de um apartamento no 4º andar e não tem acesso a rua, não vão ao Pet Shop e nem tem contato com outros animais. Não possuem pulgas e utilizam medicação preventiva mensalmente.

Há 2 anos, a gata passou a apresentar um quadro de dermatopatia intensamente pruriginosa. No início desses sintomas, ambos alimentavam-se de Ração Super Premium, entretanto a proprietária diz que a gata recebia petiscos diversos (pedaço de presunto, leite, sache de ração úmida). Relata que a gata se coçava e lambia intensamente e que o prurido era generalizado. Foi então levada a um veterinário, que utilizou corticóide de depósito e prescreveu antihistamínico e antipulgas mensalmente em ambos gatos (mas não havia pulgas). A gata respondeu muito bem, mas sempre havia recaídas ao fim do efeito da medicação. Foram feitas mais algumas aplicações desse medicamento, mas sem sucesso.

Foi então submetida a dieta de exclusão com ração hipoalergênica e os dois gatos foram mantidos estritamente com a dieta. Não houve qualquer tipo de melhora após 6 meses de utilização da dieta. Está usando atualmente Ciclosporina manipulada sem qualquer melhora clínica;

- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta sem alteração, palpação abdominal sem alteração, tºC normal, ausência de ectoparasitas;
- **Exame dermatológico:** Presença de inúmeras placas intensamente hiperêmicas e erodidas na extensão da região abdominal (GRANULOMA EOSINOFÍLICO);

Pápulo-crostas em ambos os pavilhões auriculares (que também se encontram bem hiperêmicos) e na região pré-auricular; lesão úmida, levemente erodida no MPE. Eritodermia generalizada;





- **Suspeita clínica:** Dermatite atópica

- **Diagnóstico diferencial:** Alergia alimentar?

- **Exames complementares:**
 1. Citologia epidérmica: Presença de moderada quantidade de Eosinófilos, alguns neutrófilos e muitos cocos

- **Tratamento:**
 1. Corticosteróide VO 48/48h e depois 72/72h;
 2. Ciclosporina VO;
 3. Ácidos graxos VO;
 4. Corticosteróide em spray;
 5. Medicação tópica antipulgas

OBS: Após 60 dias de tratamento, a gata encontra-se sem prurido e utilizando somente Ciclosporina VO.





www.drapriscilaalves.com.br