

[DERMATITE ÚMIDA AGUDA SECUNDÁRIA A INFESTAÇÃO POR PULGAS]

Animal apresenta-se prostrado, diminuindo apetite, normúria e normoquesia. O proprietário diz que o animal passa a maior parte do seu tempo coçando-se e chora. Foi levado a consulta por apresentar-se com uma ferida na região do pescoço bastante dolorida e disse que o aparecimento foi repentino. Não está utilizando nenhuma medicação na lesão e não utiliza nenhum tratamento preventivo para ectoparasitas.

dermatite úmida aguda secundária a infestação por pulgas

- Anamnese: Canino, poodle, fêmea, preta, 4 anos, não castrada
- Histórico: Animal apresenta-se prostrado, diminuindo apetite, normúria e normoquesia. O proprietário diz que o animal passa a maior parte do seu tempo coçando-se e chora. Foi levado a consulta por apresentar-se com uma ferida na região do pescoço bastante dolorida e disse que o aparecimento foi repentino. Não está utilizando nenhuma medicação na lesão e não utiliza nenhum tratamento preventivo para ectoparasitas.
- Exame clínico: Todos os parâmetros dentro da normalidade. Presença de infestação por pulgas.
- Exame dermatológico: Presença de lesão circular, eritematosa, úmida, com crosta, bastante dolorida na região cervical dorsal
- Tratamento: Feita tricotomia, limpeza e curativo da lesão. Prescrita medicação tópica a base de corticosteróides e medicação "top spot" a base de fipronil mensalmente.

Após 7 dias de tratamento a lesão cicatrizou completamente!

Imagens do Caso:

