

**[DERMATOFITOSE
CANINA
GENERALIZADA
SECUNDÁRIA A
CORTICOTERAPIA]**

- **Anamnese:** Canino, Yorkshire Terrier, fêmea, 6 anos;
- **Histórico:** Cadela apresenta dermatopatia há 1 ano e já foi em inúmeros veterinários. Iniciaram-se lesões alopécicas, crostosas e levemente pruriginosas. Foram feitos um EPRC (raspado cutâneo) e um micológico direto, onde foram encontrados artroconídeos. O animal foi submetido a tratamento antifúngico por 30 dias, porém não houve nenhuma melhora no quadro e foram prescritos antibióticos e corticoides, este último sendo utilizado por muitos meses. O animal não apresentou nenhuma melhora clínica e houve evolução do quadro dermatológico. Contactantes normais.
- **Exame dermatológico:** Presença de grandes áreas de alopecia com crostas, hiperpigmentação/ liquenificação e descamação acentuada. Mau odor.





- **Exames complementares:**
 1. EPRC: negativo
 2. Luz de Wood: Positivo
 3. Cultura fúngica: *Microsporum canis*

- **Tratamento:**
 1. Antifúngicos VO;
 2. Banhos com xampus específicos;
 3. Ácidos graxos VO;

Obs: Após 60 dias de tratamento, a cadela teve uma grande melhora, entretanto veio a óbito por problemas reprodutivos.