

[ESCABIOSE CANINA]

- **Anamnese**: Canino, Cocker Spaniel, macho, preto, 2 meses;
- **Histórico**: Proprietário relata que comprou o animal em um canil há 15 dias e que iniciou episódios de prurido acentuado há 7 dias após ter ido ao pet shop. Normofagia (ração comercial), normúria, normoquesia e normodipsia. Não está utilizando nenhuma medicação. Não foi vacinado e vermifugado. Ativo;
- **Exame clínico**: Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta cardiopulmonar sem alteração, palpação abdominal sem alteração, t°C 39;
- **Exame dermatológico**: Presença de áreas de alopecia/ hipotricose nos pavilhões auriculares, região cervical ventral, membros anteriores e posteriores, região abdominal e cauda. Todas essas áreas são acompanhadas de crostas melicéricas e descamação acentuada. Muitas regiões como as bordas das orelhas, cotovelos e joelhos apresentam espessamento cutâneo;
- **Exames complementares**:
 - Exame Parasitológico do Raspado Cutâneo: Positivo para *Sarcoptes scabiei*.







- **Tratamento:**

1. Terapia tópica a base de Selamectina;
2. Terapia tópica a base de Peróxido de Benzoíla;

Obs.: O animal recuperou-se completamente em 4 semanas