

[FIBROMA EM FELINO]

O fibroma é uma neoplasia benigna derivada de fibroblastos dérmicos ou subcutâneos que se caracterizam por produzirem grande quantidade de estroma colagenoso. Esse tumor é comum em eqüinos e incomum no cão. Sua ocorrência em gatos é incerta, pois se acredita que tumores com características histológicas de fibroma sejam, na verdade, fibrossarcomas bem diferenciados. Entretanto, alguns autores consideram o fibroma como comum em gatos. Em humanos, os fibromas cutâneos são denominados de dermatofibromas.

- **Anamnese:** Felino, macho, SRD, Cinza, 8 anos, castrado
- **Histórico:** Animal foi encontrado na rua com lesão ulcerada contaminada e crostosa na região cervical dorsal e lateral direita. Ficou internado na clínica para higienização e cicatrização da ferida. Normofagia, normúria, normoquesia e normodipsia. Ausência de ectoparasitas. Ativo.
- **Tratamento:** Procedeu-se a higienização, tricotomia e antissepsia da lesão. Iniciou-se uma seqüência de curativos diários com limpeza seguida da aplicação pomada cicatrizante e utilização de colar elisabetano.







Obs.: Após a seqüência de curativos, houve melhora no aspecto da lesão, entretanto, não houve qualquer sinal de cicatrização. Foram feitas tentativas com os mais variados produtos cicatrizantes e não houve melhora. Não foi observado qualquer piora da lesão.

- **Tratamento:** Procedeu-se ao debridamento cirúrgico e a realização de pontos de aproximação a fim de facilitar a cicatrização.

Obs.: Não havendo melhora no quadro, optou-se, então, por fazer a biópsia para realização de exame histopatológico.

- Exames complementares:

- **Histopatológico:**

- Material recebido: fragmento de pele e fragmento de tumoração em formol 10%

- Macroscopia: fragmento irregular de pele medindo 1,2 x 1 x 0,4 cm. Fragmento de tumoração medindo 2 x 1,3 x 0,4. Ao corte, exibe coloração esbranquiçada e consistência firme. O material recebido foi clivado em 5 fragmentos e estes foram incluídos em 2 blocos de parafina.

- Microscopia: pele exibindo presença de melanócitos e mastócitos na derme superficial. Fragmento de tumoração exibindo proliferação de fibras colágenas e de fibroblastos que intercalados formam uma estrutura delimitada na derme.

- Conclusão: **MELANOSE E FIBROMA**

- Tratamento: Após o diagnóstico de fibroma, foi feita uma retirada cirúrgica das margens da lesão. Em três meses houve cicatrização total da lesão.

Dra Luciane Pereira e Dra Simone Novais

Veterinária Vila da Penha

