

**[LINFOMA
EPITELIOTRÓPICO:
MICOSE FUNGÓIDE E
RETICULOSE
PAGETÓIDE]**

- **Anamnese:** Canino, poodle, fêmea, branca, castrada, 13 anos;
- **Histórico:** Canino apresenta histórico de dermatopatia há 6 meses. Relata início de despigmentação afetando ponte e espelho nasal e progredindo para região perilabial. Foi suspeitado de doença autoimune e foi prescrito tratamento com prednisona oral. Entretanto, não houve melhora. Há prurido moderado. Houve generalização do quadro e o animal apresenta-se hiporético e prostrado;
- **Exame dermatológico:** Presença de despigmentação em espelho/ponte nasal, regiões perilabial e periorcular. Algumas áreas encontram-se erodidas e com crostas melicéricas. Na região dorsal, há inúmeros “nódulos” pigmentados e eritrodermia esfoliativa. Há intenso edema vulvar, com desvio lateral da sua abertura;







- **Exames complementares:**

- EPRC: Negativo
- Hematologia: trombocitopenia
- Bioquímica: normal
- T4 livre por diálise: normal
- Ultrassonografia abdominal: hepatomegalia e esplenomegalia

Foram coletados fragmentos cutâneos para a realização de histopatologia.

- Histopatologia:

- 1) Cortes histológicos seqüenciais de fragmentos de pele, todos exibindo padrão lesional semelhante. Atingindo principalmente a derme superficial e média existe proliferação neoplásica em padrão perianexal coalescente composta por células redondas grandes morfológicamente compatíveis com linfócitos jovens. Elas propagam-se de maneira desordenada por entre as fibras de colágeno e infiltram intensamente o epitélio folicular e a epiderme. A junção dermo-epidérmica é quase que completamente obliterada pela proliferação neoplásica. O índice mitótico é de 4 f.m./ 40x com figuras mitóticas aberrantes. Em um dos fragmentos a neoplasia é acompanhada de hemorragia intensa na derme.

Linfoma Epiteliotrópico fase micose fungóide

- 2) Cortes histológicos sequenciais de fragmentos de pele, todos exibindo padrão lesional semelhante. Atingindo principalmente a camada basal e espinhosa da epiderme existe intensa

infiltração multifocal a difusa por linfócitos atípicos. A mesma infiltração multifocal a difusa é observada no epitélio dos folículos pilosos e nas glândulas apócrinas e sebáceas. A derme superficial e média exibe edema e infiltrado inflamatório misto em padrão perivascular a difuso. Foi realizada coloração especial para fungos (PAS c/d) que resultou negativa.

Linfoma Epiteliotrópico fase reticulose pagetóide

Obs: O paciente foi encaminhado para avaliação oncológica e tratamento, porém o proprietário optou apenas pelo tratamento de suporte e tratamento tópico.