

[PIODERMITE PRIMÁRIA]

- **Anamnese:** Canino, Dachshund, bege, macho, não castrado, 7 meses
- **Histórico:** Proprietário relata que o animal possui dermatopatia desde os 4 meses. O quadro inicia com a formação de pápulas e com a presença de um prurido leve. A medida que o quadro evolui com a formação de pústulas, desenvolve-se um prurido intenso. Já foi levado a alguns veterinários e utilizou alguns antibióticos, corticosteróides e acaricidas por via oral além de acaricidas tópicos e xampus antibacterianos. Em todos os tratamentos houve uma pequena resposta e com recidiva assim que o tratamento era suspenso. Já apresentou miíase na ponta da cauda por conta do animal coçar intensamente. Normofagia (ração comercial), normúria, normoquesia e normodipsia. Ausência de ectoparasitas. Vacinado e vermifugado. Ativo.
- **Exame dermatológico:** Presença de furunculose em toda a região abdominal e face interna das coxas, regiões de hipotricose na região dorsal e face lateral do tórax bilateralmente e cauda.
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta sem alteração, palpação abdominal sem alteração, temperatura normal.





- **Exames complementares:**

1. Exame parasitológico do raspado cutâneo: Negativo
2. Citologia: Presença de neutrófilos e fagocitose de bactérias

- **Tratamento:**

1. Antibiótico VO a base de Cefalexina;
2. Antihistamínico a base de Clemastina;
3. Ácidos graxos ômega 3 e ômega 6;
4. Xampu a base de Clorexidine 3/3 dias;

Obs: A terapia foi instituída por 30 dias e mantido por mais 30 dias. Houve remissão total das lesões e do prurido, entretanto, o animal foi mantido em pulsoterapia de fim de semana (sextas, sábados e domingos).





