

[SEBORRÉIA PRIMÁRIA]

- **Anamnese**: Canino, Cocker Spaniel Inglês, dourado, macho, 1 ano;
- **Histórico**: Proprietário diz que o animal apresenta um quadro de dermatopatia intensamente pruriginosa com início aos 4 meses de vida. Nunca foi submetido a nenhum tipo de tratamento clínico, entretanto já foram utilizados diversos tratamentos “caseiros”, mas sem qualquer melhora do quadro. Convive com mais 3 outros cães que encontram-se normais. Vive em sítio, há histórico de ectoparasitas e não há utilização de medicações preventivas. Alimenta-se de ração comercial de baixa qualidade, porém também tem acesso a alimentação caseira. São feitos banhos quinzenais com sabonete humano. Comportamento ativo.
- **Exame clínico**: Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos poplíteos hipertrofiados, ausculta sem alteração, palpação abdominal sem alteração, t°C normal;
- **Exame dermatológico**: Animal apresentando quadro de seborréia oleosa generalizada. Presença de áreas de hipotricose na face e região cervical ventral, hiperqueratose e lignificação em toda a região ventral, incluindo a região perianal. Otite bilateral com a presença de acentuada quantidade de secreção ceruminosa e lesões com crostas hemáticas na margem do pavilhão auricular;

- **Exames complementares:**

1. Exame Parasitológico do Raspado Cutâneo: Negativo;
2. Citologia Epidérmica (por *imprint* com fita adesiva):
Presença de acentuada quantidade de células epiteliais superficiais descamativas e incontáveis estruturas leveduriformes compatíveis com ***Malassezia sp;***
3. Citologia otológica: Presença de acentuada quantidade de estruturas leveduriformes compatíveis com ***Malassezia sp;***

OBS.: Foi solicitado o exame histopatológico, porém o proprietário protelou a sua realização.

- **Tratamento:**

1. Corticosteróide VO
2. Antifúngico VO
3. Ácidos graxos ômega 3/6
4. Terapia tópica a base de xampu com ação desengordurante/ leveduricida e ceruminolíticos nos ouvidos;

OBS.: O animal manteve-se internado na clínica por um período de 3 semanas para intensificar o tratamento. Houve uma grande melhora do quadro com redução a níveis mínimos de prurido.

O tratamento foi readequado depois desse período e deu-se sequência em casa pelo proprietário.





