

[VASCULITE IDIOPÁTICA]

- **Anamnese:** Canino, Pinscher, fêmea, black and tan, 7 anos;
- **Histórico:** Proprietário relata que o animal está há 6 meses com uma lesão no dígito do membro posterior esquerdo (MPE). Diz que a lesão somente regride e cicatriza quando o animal é submetido ao uso de corticoterapia. Utilizou alguns tipos de antibióticos e tratamento tópico cicatrizante, mas sem resposta. A cadela lambe a lesão incessantemente. Normofagia, normúria, normoquesia e normodipsia. Ativa. Ausência de ectoparasitas e contactantes;
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, cavidade oral sem alteração, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta cardiopulmonar sem alteração, t°C 39,1, agressiva;
- **Exame dermatológico:** Presença de lesão erodida no coxim plantar do 2º dígito do MPE com centro ulcerado. Ausência de secreção e dor.





- **Exames complementares:**

1. Exame parasitológico do raspado cutâneo (EPRC):
Negativo;
2. Citologia epidérmica: Presença de neutrófilos e acentuada quantidade de cocos;
3. Histopatológico: Processo inflamatório rico em histiócitos e plasmócitos (granuloma) – **VASCULITE GRANULOMATOSA**

- **Tratamento:**

1. Vasodilatador periférico VO
2. Corticoterapia VO
3. Corticoterapia tópica